

MO 29: INTEGRÁLNY POČET

MO 29:
INTEGRÁLNY POČET

- integrál sa používa na výpočet nepravidelných plôch
- integrálmi sa zaoberali Newton a Leibniz

Pojem primitívnej funkcie

- Nech je daná funkcia $y = f(x)$ na intervale (a,b) .
- $F(x)$ sa nazýva primitívnou funkciou funkcie $f(x)$ na intervale (a,b) , ak $\forall x \in (a,b); [F(x)]' = f(x)$
- napr. $f(x) = x$

$$F(x) = \frac{1}{2}x^2 + 5$$

→ 5 = integračná konštanta, označujeme ju c

- k funkcii $f(x)$ existuje nekonečne veľa primitívnych funkcií, ktoré sa navzájom líšia o integračnú konštantu c
- $F(x)$ označujeme $\int f(x)dx$
 - napr. $\int x dx = \frac{1}{2}x^2 + c$
- integrály poznáme:
 - neurčitý integrál
napr. $\int f(x)dx = F(x)$
 - určitý integrál
napr. $\int_a^b f(x) dx = \text{číslo}$

Neurčitý integrál

- = primitívna funkcia

$$\int 1 dx = x + c$$

$$\int k dx = k \cdot x + c$$

$$\int x dx = \frac{1}{2}x^2 + c$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \int x^{-1} dx = \ln |x| + c$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c \quad \int e^x dx = e^x + c$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \text{arctg } x + c$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + c$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + c$$

$$\int \cos x dx = \sin x + c$$

MO 29: INTEGRÁLNY POČET

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \operatorname{tg} x + c$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\operatorname{cotg} x + c$$

$$\int \operatorname{tg} x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = -\ln|\cos x| + c$$

$$\int \operatorname{cotg} x dx = \int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \ln|\sin x| + c$$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + c$$

$$\int (f(x) \pm g(x)) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

- **Metóda Per Partes**

$$\int u(x) \cdot v'(x) dx = [u(x) \cdot v(x)] - \int u'(x) \cdot v(x) dx$$

napr.

$$\int x \cdot e^x dx = x \cdot e^x - \int 1 \cdot e^x dx = x \cdot e^x - e^x + c$$

$$\left| \begin{array}{ll} u = x & v' = e^x \\ u' = 1 & v = e^x \end{array} \right|$$

- **Substitučná metóda**

napr. $\int 2^{x+2} dx$

- zvolíme si substitúciu, ktorú zderivujeme
 $t = x+2$
 $dt = dx$


$$\int 2^t dt = \frac{2^t}{\ln 2} = \frac{2^{x+2}}{\ln 2} + c$$

- **Limitné procesy pri výpočte veľkostí plôch**

- **Dolný súčet**

$$s(f, D) = m_1(x_1 - x_0) + m_2(x_2 - x_1) + \dots + m_n(x_n - x_{n-1}) = \sum_{i=1}^n m_i(x_i - x_{i-1})$$


$$m_1 = \operatorname{infimum} f(x) \text{ na } \langle x_0, x_1 \rangle$$



MO 29: INTEGRÁLNY POČET

- **Horný súčet**

$$S(f, D) = M_1(x_1 - x_0) + M_2(x_2 - x_1) + \dots + M_n(x_n - x_{n-1})$$



$$M_1 = \text{supremum } f(x) \text{ na } \langle x_0, x_1 \rangle$$

→ oblasť medzi $f(x)$ a osou x na intervale $\langle a, b \rangle$ sa nazýva **elementárna plocha** $S(E)$

$$s(f, D) \leq S(E) \leq S(f, D)$$

Určitý integrál

- funkcia $f(x)$ je integrovateľná na intervale $\langle a, b \rangle$
- spoločnú hodnotu horného a dolného integrálu budeme nazývať určitým integrálom funkcie

f na intervale $\langle a, b \rangle$ a označovať $\int_a^b f(x) dx$

- **Newton – Leibnizova formula**

- Daná je $f(x)$, ktorá je na intervale $\langle a, b \rangle$ a je integrovateľná.

- $$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

$$\text{napr. } \int_1^3 (x^2 + 2) dx = \left[\frac{x^3}{3} + 2x + c \right]_1^3 = 9 + 6 + c - \left(\frac{1}{3} + 2 + c \right) = \frac{38}{3}$$

- výsledkom určitého integrálu je vždy číslo

- **Plocha ohraničená grafmi funkcií**

napr. $f: y = 2x^2 - 4x$

$g: y = -x^2 + 4$

$S(E) = ?$

→ vypočítame, na ktorom intervale sa nachádza plocha

$$-x^2 + 4 = 2x^2 - 4x$$

$$0 = (x-2) \left(x + \frac{2}{3} \right) \rightarrow I: \left\langle -\frac{2}{3}; 2 \right\rangle$$

$$S(E) = \int_{-\frac{2}{3}}^2 ((-x^2 + 4) - (2x^2 - 4x)) dx$$

